

Construção e Análise de Algoritmos
Lista de exercícios 4

1.

- (a) Explique informalmente o que significa um problema ser NP-Completo. Do ponto de vista prático, qual é a relevância de se determinar que um certo problema é NP-Completo?
- (b) Para cada uma das afirmações abaixo, diga se ela é *verdadeira*, *falsa*, *verdadeira se $P \neq NP$* ou *falsa se $P \neq NP$* . Dê uma justificativa curta para cada resposta.
 - (1) Não há problemas em P que são NP-Completo
 - (2) Existe apenas algoritmo exponencial para o problema da parada
 - (3) Existem problemas em P que estão em NP
 - (4) Existem problemas em NP que não estão em P
 - (5) Se A pode ser polinomialmente reduzido a B, e B é NP-Completo, então A é NP-Completo
 - (6) Se A pode ser polinomialmente reduzido a B, e $B \in P$, então $A \in P$
 - (7) O problema do Caixeiro Viajante é NP-Completo

2. Seja $0 < \alpha < 1$ um número qualquer. Seja (α) -CLIQUE o problema de decidir se, dado como entrada um grafo G , existe uma clique com mais de αn vértices, onde n é o número de vértices de G . Prove que (α) -CLIQUE é NP-Completo. **Obs:** O valor de α faz parte do problema, e não da entrada do problema (a entrada é apenas um grafo).

3. Dado um grafo G , uma coloração é uma atribuição de cores a seus vértices de forma que vértices adjacentes tenham cores diferentes. Seja 3CORES o problema de decidir se, dado um grafo G como entrada, G pode ser colorido com 3 cores. Mostre que 3CORES é NP-Completo.




FIGURA 1. Use essas engrenagens na questão 1

4. Dizemos que um grafo G está parcialmente rotulado se alguns de seus vértices possuem um número inteiro como rótulo. Dado um vértice rotulado v de G , seja $r(v)$ o seu rótulo. Seja CAMPO-MINADO o problema de decidir se, dado como entrada

um grafo G parcialmente rotulado, G pode ser completamente rotulado de forma que qualquer vértice v com rótulo positivo tenha exatamente $r(v)$ vizinhos com rótulo negativo. Prove que CAMPO-MINADO é NP-Completo. Dica: Imagine rótulos negativos como bombas do campo minado. Tente reduzir 3SAT para este problema: cada variável tendo dois vértices no grafo com um vizinho comum com rótulo igual a 1. Pense nas bombas do campo minado como uma atribuição de Verdadeiro.

5. Considere os seguintes problemas de decisão: MAX3SAT (“Dada uma fórmula 3CNF e um inteiro k , existe uma atribuição de valores às variáveis que satisfaz pelo menos k cláusulas?”), SUBGR-DENSO (“Dado um grafo G e dois inteiros k e m , existe em G um subgrafo com k vértices e m arestas?”), MAX-CAMPOMINADO (“Dado um número k e um grafo G parcialmente rotulado com números inteiros nos vértices, G pode ser completamente rotulado como no exemplo do Campo Minado, usando menos de k bombas?”). Prove que esses problemas são NP-Completo.

6. No seguinte jogo de paciência, é dado um tabuleiro $n \times n$. Em cada uma das suas n^2 posições está colocada uma pedra azul ou uma pedra vermelha ou nenhuma pedra. Você joga removendo pedras do tabuleiro até que cada coluna contenha pedras de uma única cor e cada linha contenha pelo menos uma pedra. Você vence se atingir esse objetivo. Vencer pode ser possível ou não, dependendo da configuração inicial. Seja PACIÊNCIA o problema de decidir se dado um tabuleiro dessa forma como entrada é possível vencer. Prove que PACIÊNCIA é NP-Completo. Dica: Tente reduzir 3SAT para este problema: pense as colunas como variáveis e as linhas como cláusulas. Depois adicione algumas linhas e colunas inócuas para que o tabuleiro fique quadrado.

7. Seja DOMINANTE o problema de decidir se, dado como entrada um grafo G e um inteiro $k > 0$, existe um conjunto D com k vértices de G tal que todo vértice de G está em D ou é adjacente a algum vértice de D . Prove que DOMINANTE é NP-Completo. Dica: Reduza o problema de cobertura de vértices para este problema.

8. Seja COR-DIF o problema de decidir se, dado como entrada um conjunto S e uma coleção $C = \{C_1, \dots, C_k\}$ de subconjuntos de S , onde $k > 0$, é possível colorir os elementos de S com duas cores de forma que nenhum conjunto C_i tenha todos os seus elementos com a mesma cor. Dica: Tente reduzir 3SAT para este problema: Crie um conjunto S contendo toda variável e seu complemento. Adicione um elemento especial F a S . Para cada variável, crie um subconjunto C_i contendo apenas ela e seu complemento. Para cada cláusula, crie um subconjunto C_j contendo seus literais e mais o elemento especial F .