

Matemática Discreta
Lista de exercícios 2

Cada $\sqrt{}$ denota um nível de dificuldade: $\sqrt{}$ fácil, $\sqrt{\sqrt{}}$ médio e $\sqrt{\sqrt{\sqrt{}}}$ difícil.

$\sqrt{\sqrt{}}$ 1. (**indução**) Prove por indução que o número de movimentos para levar n discos de uma haste até outra haste da Torre de Hanói é $2^n - 1$.

$\sqrt{\sqrt{}}$ 2. (**indução**) Mostre por indução que, se $n \in \mathbb{N}^*$ é uma potência de 2 ($n = 2^k$, para algum $k \in \mathbb{N}$) e $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função tal que $T(n) = 2 \cdot T(n/2) + n$ e $T(1) = 1$, então $T(n) = n \log_2 n + n$.

$\sqrt{\sqrt{}}$ 3. (**relações**) Sejam R uma relação binária e A e B conjuntos. Por simplicidade de notação, escrevemos $R[X]$, onde X é um conjunto, para indicar $R[X, X]$. Prove ou construa um contra-exemplo:

- | | |
|--|--|
| (a) $R[A \cap B] \subseteq R[A] \cap R[B]$. | (d) $R[A \cap B] \supseteq R[A] \cap R[B]$. |
| (b) $R[A \cup B] \subseteq R[A] \cup R[B]$. | (e) $R[A \cup B] \supseteq R[A] \cup R[B]$. |
| (c) $R[A - B] \subseteq R[A] - R[B]$. | (f) $R[A - B] \supseteq R[A] - R[B]$. |

$\sqrt{\sqrt{}}$ 4. (**relações**) Mostre que se R é uma relação reflexiva e transitiva, então $R \cap R^{-1}$ é uma relação de equivalência, onde $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$.

$\sqrt{\sqrt{\sqrt{}}}$ 5. (**relações**) Sejam A um conjunto e $R \subseteq A \times A$. Seja ainda

$$S = \{(a, a') \mid \exists a'' \in A, (a, a'') \in R \wedge (a'', a') \in R\}.$$

Prove ou dê um contra-exemplo:

- (a) se R é uma relação de equivalência, então S também o é.
(b) se S é uma relação de equivalência, então R também o é.

$\sqrt{}$ 6. (**relações**) Sejam A um conjunto e $R \subseteq A \times A$ uma ordem parcial. Mostre que se $B \subseteq A$, então $R \cap (B \times B)$ é uma ordem parcial.

$\sqrt{}$ 7. (**funções**) Dada um função bijetiva qualquer $F : A \rightarrow A$ em um conjunto A , determine qual é a função $(F \circ F) \circ ((F^{-1} \circ F^{-1}) \circ F)$. Justifique.

$\sqrt{\sqrt{}}$ 8. (**funções**) Para $n \geq 3$, considere n funções $f_1, \dots, f_n$ tais que $\text{Img}(f_k) \subseteq \text{Dom}(f_{k+1})$ para $k \in \{1, \dots, n-1\}$. Prove por indução que:

$$f_n \circ (f_{n-1} \circ (\dots \circ (f_3 \circ (f_2 \circ f_1)) \dots)) = ((\dots ((f_n \circ f_{n-1}) \circ f_{n-2}) \circ \dots) \circ f_2) \circ f_1.$$

✓✓ **9. (funções)** Considere a relação $R = \{(S_1, S_2) : S_1, S_2 \subsetneq \{a, b, c, d\} \text{ e } S_1 \subseteq S_2\}$.

(a) Represente a relação R graficamente.

(b) Prove que R é uma **ordem parcial**.

(c) R tem elemento mínimo? minimal? máximo? maximal? Se sim, quais?

✓✓ **10. (funções)** Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções tais que a composta $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é bijetora. Prove que f injetora e que g é sobrejetora.

✓✓✓ **11. (funções)** Sejam f e g as funções

$$f(x) = \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} \qquad g(x) = 3^x.$$

(a) Determine a função $f^{-1}(x)$ (a função **inversa** de f).

(b) Determine a função $h(x) = g(f^{-1}(x))$ (**composta** de g com f^{-1}).

✓✓ **12. (funções)** Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função $f(x) = x^2 - 8x + 15$.

(a) Explique porque f não é **injetora**. Explique porque f não é **sobrejetora**.

(b) Mude o mínimo possível o domínio e o contra-domínio para que f fique **bijetora**.

(c) Com as mudanças do item (b), determine a função **inversa** f^{-1} de f .

✓✓ **13. (recorrências)** Resolva as seguintes recorrências:

(a) $a_n = a_{n-1} + 7$, $a_0 = 13$;

(b) $a_n = 5 \cdot a_{n-1} + 3$, $a_0 = 8$;

(c) $a_n = 5 \cdot a_{n-1} - 6 \cdot a_{n-2}$, $a_0 = 2$, $a_1 = 5$;

(d) $a_n = 4 \cdot a_{n-1} - 4 \cdot a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$;

(e) $a_n = 5 \cdot a_{n-1} - 6 \cdot a_{n-2} + 6$, $a_0 = 5$, $a_1 = 8$;

✓✓ **14. (recorrências)** Seja $n = 3^k$, para algum $k \in \mathbb{N}$. Resolva a seguinte relação de recorrência: $T(n) = T(n/3) + 17$, $T(1) = 29$.

✓✓✓ **15. (recorrências)** Assumindo que n é uma potência de 2, resolva a seguinte relação de recorrência e depois prove a corretude por indução:

$$\begin{aligned} T(n) &= 6 \cdot T(n/2) - 8 \cdot T(n/4), \text{ se } n > 2 \\ T(1) &= 2 \\ T(2) &= 6 \end{aligned}$$

(**Dica:** é possível obter uma recorrência de 2º ordem para nos ajudar. Para isso, substitua n por 2^k na recorrência)